
วิธีป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า

- สำหรับสัตว์เลี้ยง (สุนัข-แมว)

💉 ฉีดวัคซีนเป็นประจำทุกปี

🏡 เลี้ยงอย่างรับผิดชอบ ไม่ปล่อยเพ่นพ่าน

🐾 ทำหมัน ควบคุมจำนวนสัตว์จรจัด



- สำหรับคน:

❌ อย่าแหย่สัตว์ ไม่เข้าใกล้สัตว์แปลกหน้า

🚿 ล้างแผลด้วยสบู่และน้ำไหลนานอย่างน้อย 10 นาที

🩹 ใส่ยาฆ่าเชื้อ เช่น เบตาดีน และรีบพบแพทย์ทันที

องค์การบริหารส่วนตำบลไทรขึง

โทรศัพท์. 077-310-715

องค์การบริหารส่วนตำบลไทรขึง

✅ ข้อควรจำ

- *โรคนี้ ป้องกันได้ 100% ด้วยการฉีดวัคซีนทันทีหลังถูกกัด หรือข่วน*
- *สัตว์เลี้ยงควรได้รับวัคซีนเป็นประจำทุกปี*
- *ห้ามละเลยบาดแผลเล็กน้อยที่เกิดจากสัตว์*

⚠️

- วัคซีนสามารถป้องกันโรคได้ หากได้รับทันเวลาและครบชุด

- หากพบสัตว์ต้องสงสัย แจ้งเจ้าหน้าที่ปศุสัตว์ หรือ อบต.



องค์การบริหารส่วนตำบลไทรขึง อ.พระแสง จ.สุราษฎร์ธานี

โรคพิษสุนัขบ้า ป้องกันได้... ถ้ารู้ทัน!



โรคพิษสุนัขบ้า คืออะไร?



โรคพิษสุนัขบ้า (Rabies) คือ โรคติดต่อร้ายแรงจากสัตว์สู่คน ที่เกิดจากการติดเชื้อไวรัส “เรบีส์” (Rabies virus) ซึ่งอยู่ในน้ำลายของสัตว์ที่เป็นโรค



- โรคติดต่อร้ายแรงจากสัตว์สู่คน เกิดจากเชื้อไวรัสเรบีส์
- ติดต่อผ่านน้ำลายของสัตว์ที่ติดเชื้อ โดยการกัด ข่วน หรือเลียแผล
- หากมีอาการแล้ว เสียชีวิต 100%

ลักษณะสำคัญของโรคพิษสุนัขบ้า

- *พบได้ใน สัตว์เลี้ยงลูกด้วยนม เช่น สุนัข, แมว, ค้างคาว, ลิง, วัว, ฯลฯ*
- *สัตว์ติดเชื้อจะปล่อยเชื้อไวรัสผ่าน น้ำลาย*
- *มักติดต่อสู่คนโดย การถูกกัด ข่วน หรือเลียบริเวณผิวหนังที่มีแผล*



ลักษณะสำคัญของโรคพิษสุนัขบ้า

- *พบได้ใน สัตว์เลี้ยงลูกด้วยนม เช่น สุนัข, แมว, ค้างคาว, ลิง, วัว, ฯลฯ*
- *สัตว์ติดเชื้อจะปล่อยเชื้อไวรัสผ่าน น้ำลาย*
- *มักติดต่อสู่คนโดย การถูกกัด ข่วน หรือเลียบริเวณผิวหนังที่มีแผล*

! อาการของโรคที่เกิดในคน

เมื่อเชื้อเข้าสู่ร่างกาย จะใช้เวลาฟักตัว 1–3 เดือน (ขึ้นอยู่กับตำแหน่งที่ถูกกัด) จากนั้นจะเริ่มแสดงอาการ เช่น:

- มีไข้ ปวดเมื่อย คันบริเวณแผล
- วิตกกังวล กระวนกระวาย
- กลัวน้ำ กลัวแสง กลืนลำบาก
- กล้ามเนื้อเกร็ง ชัก และหมดสติ

สัญญาณเตือนของสัตว์ที่อาจติดเชื้อ:

- ดุร้าย ก้าวร้าวผิดปกติ
- ซึม ไม่กินน้ำ น้ำลายไหล
- เกร็ง กล้ามเนื้อสั่น หรืออัมพาต

